



VACCINAREA ANTIGRIPALĂ LA COPII- MATERIAL EDUCATIV PENTRU PĂRINȚI

Gripa este o boală acută respiratorie cu caracter sezonier (apare predominant pe perioada iernii) și este cauzată de virusurile gripale A, B sau foarte rar C. Deși este o boală care în mod normal trece de la sine, uneori poate avea complicații severe în timpul bolii sau la distanță. Vaccinarea poate preveni infecția sau complicațiile severe și poate proteja populația la risc pentru o boală severă. Printează sau salvează acest document dacă dorești să te informezi despre vaccinarea antigripală. Acest document are caracter informativ.

Cât de eficient este vaccinul?

Vaccinul este eficient în prevenția gripei și utilizat de peste 75 ani, cu eficiență împotriva gripei de 70-90%.

Ce tipuri de vaccin există?

Cel mai utilizat este vaccinul antigripal trivalent sau tetravalent, cu virusuri gripale inactivate, ce conține 3, respectiv 4 tulpini de virus gripal. Este recomandat cel tetravalent pentru o protecție mai bună. Există și vaccin antigripal cu virus gripal viu atenuat (Fluenz Tetra). În România cele mai utilizate vaccinuri la copii sunt: Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra, Fluarix Tetra, Fluenz Tetra spray nazal.

De la ce vârstă se poate administra?

Acesta se poate administra începând cu vârsta de 6 luni (Vaxigrip Tetra, Fluarix Tetra).

Cum se administrează vaccinul?

Administrare injectabilă

Vaxigrip Tetra, Fluarix Tetra- de la 6 luni
Influvac Tetra- de la 3 ani

Administrare intranasală

Fluenz Tetra spray nazal
Copii peste 2 ani și adolescenți

La copiii cu vârsta sub 9 ani, care nu au fost vaccinați anterior, trebuie administrată a doua doză după un interval de cel puțin 4 săptămâni.

AUTOR: DR. MIHAELA GUȚU-ROBU, medic rezident Pediatrie

Text revizuit de: DR. CRISTIANA NASTAC, medic specialist Pediatrie

Bibliografie:

1. Hall E., CDC, Pinkbook, Ch.12: Influenza; Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases
2. Streinu-Cercel A., Aramă V., Calistru Petre Iacob, Boli infecțioase, Curs pentru studenți și medici rezidenți, vol.1, cap. 13: Gripa sezonieră
3. UptoDate- Seasonal influenza in children: Prevention with vaccines



VACCINAREA ANTIGRIPALĂ LA COPII- MATERIAL EDUCATIV PENTRU PĂRINȚI

Când se recomandă vaccinarea?

Se recomandă vaccinarea anual începând de la mijlocul toamnei.

Care sunt reacțiile adverse?

Reacțiile adverse frecvente sunt durere, roșeață, căldură la locul injectării, febră, reacții alergice observate la copiii cu alergie la proteinele din ou.

Cui se recomandă vaccinarea?

Vaccinarea este recomandată tuturor după vârsta de 6 luni. Categoriilor cu risc li se recomandă în mod special vaccinarea: prematurii cu sechele ale bronhodisplaziei, copii sub 2 ani, copii cu afecțiuni cardiace înnăscute, cu deficiente imune, boli pulmonare sau neurologice, la gravide și lăuze, etc.

Cui nu îi este recomandată vaccinarea?

Este recomandată o discuție cu medicul pediatru în cazul copiilor cu alergie la ingredientele vaccinului și în timpul unei boli acute febrile. În cazul alergiei la ou (confirmat prin test de toleranță intradermică la ovalbumină) sau Neomicină și Gentamicină se poate opta pentru vaccinare cu vaccin recombinat preparat în cultură celulară după vârsta de 18 ani. În US aceasta este posibilă începând cu vârsta de 6 luni (Flucelvax). În cazul vaccinului cu virus gripal viu atenuat contraindicațiile sunt mai numeroase și este recomandată discuția cu un medic.

AUTOR: DR. MIHAELA GUȚU-ROBU, medic rezident Pediatrie

Text revizuit de: DR. CRISTIANA NASTAC, medic specialist Pediatrie

Bibliografie:

1. Hall E., CDC, Pinkbook, Ch.12: Influenza; Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases
2. Streinu-Cercel A., Aramă V., Calistru Petre Iacob, Boli infecțioase, Curs pentru studenți și medici rezidenți, vol.1, cap. 13: Gripa sezonieră
3. UptoDate- Seasonal influenza in children: Prevention with vaccines