

CALENDARUL VACCINĂRILOR (ROMÂNIA)

Acest calendar are caracter strict orientativ și nu înlocuiește carnetul de vaccinare al copilului. Părintele îl poate utiliza pentru a bifa în tabel când s-a efectuat vaccinul și a-și aduce aminte când trebuie să programeze următorul consult la medicul de familie pentru vaccinare. Aceste vaccinuri se efectuează gratuit prin programul național de sănătate publică și au fost extrase din Calendarul național de vaccinare.

VÂRSTA RECOMANDATĂ	VACCIN	DENUMIRE COMERCIALĂ	UNDE?	DA/NU
Primele 24 h de la naștere sau în primele 2-7 zile	1. Vaccin Hepatitic B	Euvax B pediatric Engerix B	La externarea din maternitate	<input type="checkbox"/>
	2. Vaccin BCG (pentru bebelușii cu greutatea la externare > 2500 g)		La externarea din maternitate	<input type="checkbox"/>
2 luni	1. Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Influenzae B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep)- schemă vaccinare primară	Hexacima Infanrix Hexa Hexyon	La medicul de familie	<input type="checkbox"/>
	2. Vaccin pneumococic conjugat (începând cu vârsta de 6 săptămâni)	Prevenar 13 (împotriva a 13 tulpini de Streptococcus Pneumoniae- recomandat) Synflorix (împotriva a 10 tulpini de Streptococcus Pneumoniae)	La medicul de familie	<input type="checkbox"/>
4 luni	1. Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Influenzae B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep)- schemă vaccinare primară	Hexacima Infanrix Hexa Hexyon	La medicul de familie	<input type="checkbox"/>
	2. Vaccin pneumococic conjugat (începând cu vârsta de 6 săptămâni)	Prevenar 13 Synflorix	La medicul de familie	<input type="checkbox"/>
11 luni	1. Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus Influenzae B-	Hexacima Infanrix Hexa Hexyon	La medicul de familie	<input type="checkbox"/>

	hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep)- schemă vaccinare primară	Prevenar 13 Synflorix	La medicul de familie	<input type="checkbox"/>
	2. Vaccin pneumococic conjugat (începând cu vârsta de 6 săptămâni)			
12 luni	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	M-M-RvaxPro Priorix	La medicul de familie	<input type="checkbox"/>
5 ani	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	M-M-RvaxPro Priorix	La medicul de familie	<input type="checkbox"/>
5-6 ani	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTP1-VPI)- rapel	Tetraxim utilizat la rapel între 5-13 ani. Dultavax utilizat la rapel între 6-13 ani, în cazul în care există contraindicație la vaccinarea împotriva tusei convulsive (Bordetella pertussis). Adacel după vârsta de 4 ani împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, folosit la rapel după efectuarea schemei complete de vaccinare primare	La medicul de familie	<input type="checkbox"/>
14 ani	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (dTpa)- rapel	Tetraxim Dultavax Adacel	La medicul de familie	<input type="checkbox"/>

AUTORI:

Dr. Mihaela Guțu-Robu, medic rezident Pediatrie

Dr. Cristiana Nastac, medic specialist Pediatrie

SURSE BIBLIOGRAFICE:

Institutul Național de Sănătate publică România- Calendarul Național de Vaccinare

Direcția de Sănătate Publică București- Calendar de vaccinări (PDF)

Vaccine Scheduler- Romania: Recommended vaccinations